

Retente cutanée et image corporelle après perte pondérale massive : intérêt d'une prise en charge précoce de la silhouette associant compression et soins cutanés dans le parcours de soins des patients obèses

INTRODUCTION

La retente cutanée et l'image corporelle au cours d'une perte de poids massive après chirurgie bariatrique ou traitement médicamenteux de l'obésité reste un angle mort de la prise en charge des patients obèses.

Que devient la peau ?



Après amaigrissement massif

MATÉRIEL

Étude sur 50 patients obèses consécutifs du réseau ROSA du CHNDS. Il a été étudié le ressenti des patients sur leur corps et leur possibilité d'exposer leur corps ou de se regarder nu devant un miroir. Lors des consultations de suivi, l'évolution de cette aptitude à se regarder, à prendre soin de leurs corps et les changements vestimentaires ont été notés. L'amélioration de la retente cutanée et de la silhouette au cours de l'amaigrissement ont été authentifiées par photographie.

Repositionnement cutané



Corrections anatomiques

La Seconde Peau ROSA



Concept et protocole ROSA

RÉSULTATS

Grâce à une prise en charge précoce de la silhouette basée sur un repositionnement anatomique de la peau maintenu en bonne position par une compression ajustable corps entier, une hydratation et une nutrition spécifique de la peau sur la période carentielle des 2 ans post-opératoires, nous avons pu constater et évaluer une amélioration notable de la retente cutanée, de la silhouette et de l'image corporelle des patientes, source de renforcement positif et de motivation à conserver leurs nouvelles habitudes de vie.

Résultats ROSA NOVA



Données cliniques et photographiques

CAS CLINIQUE ILLUSTRATIF

PROFIL




Avant

Après



FACE



Avant

Après

DISCUSSION

Cette problématique n'apparaît que très peu dans les parcours de soins, si ce n'est à la fin de l'amaigrissement pour envisager une chirurgie réparatrice multisite, coûteuse et imparfaite dans ses résultats au vu des cicatrices multiples, des nombreuses anesthésies et périodes d'arrêt de travail, nécessaires.

CONCLUSION

Une prise en charge précoce de la silhouette de l'obèse morbide qui maigrit beaucoup et rapidement, par une compression et des soins cosmétiques adaptés, mériterait sa place dans le parcours de soins.